

1. «Гам-КОВИД-Вак» - комбинированная векторная вакцина,
«ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов,
«КовиВак» - цельновирионная инактивированная (убитая) для
профилактики коронавирусной инфекции,
вызываемой вирусом SARS-CoV-2

Курталева Любовь Александровна
26.02/2021

Вакцинация проводится в два этапа:

I компонент (число, месяц, год) 12.07.2021

II компонент (число, месяц, год) 02.08.2021



Возможные побочные действия:

После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места-вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства.